

# 膵臓がん

レジメン名	薬剤名	用量	投与日	1コース	備考
FOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	Day1	14日	インフューザーポンプ使用
	レボホリナートカルシウム	200mg/m <sup>2</sup>	Day1		
	イリノテカン	180mg/m <sup>2</sup>	Day1		
	フルオロウラシル(急速)	400mg/m <sup>2</sup>	Day1		
	フルオロウラシル(持続)	2400mg/m <sup>2</sup>	Day1(46時間)		
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	Day1	14日	インフューザーポンプ使用
	レボホリナートカルシウム	200mg/m <sup>2</sup>	Day1		
	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	Day1		
	フルオロウラシル(持続)	2400mg/m <sup>2</sup>	Day1(46時間)		
GEM単剤	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	Day1.8.15	28日	
nab-PTX+GEM	アルブミン懸濁型パクリタキセル	125mg/m <sup>2</sup>	Day1.8.15	28日	
	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	Day1.8.15		
GEM+エルロチニブ	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	Day1.8.15	28日	
	エルロチニブ	100mg/body	連日		
S-1+GEM	テガフル・ギメラシル・オテラシル	60mg/m <sup>2</sup>	Day1-14	21日	
	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	Day1.8		
nal-IRI + 5-FU/LV	レボホリナートカルシウム	200mg/m <sup>2</sup>	Day1	14日	インフューザーポンプ使用
	リポソーム封入イリノテカン	70mg/m <sup>2</sup>	Day1		
	フルオロウラシル(持続)	2400mg/m <sup>2</sup>	Day1(46時間)		

2021/3現在